

1.定期予防接種の種類と受け方
令和2年4月1日～令和3年3月31日

種類	対象年齢	接種開始年齢	接種回数	接種間隔
インフルエンザ菌 b型 (ヒブ)	生後2か月～ 5歳未満 ※接種開始年齢により 接種回数が異なります	生後2か月～ 7か月未満	初回 3回	生後12か月未満で、27日以上の間隔において3回 標準>>27日以上56日までの間隔
			追加 1回	初回3回目から7か月以上 標準>>初回3回目から7か月以上13か月までの間隔
			注意事項	初回接種(2回目及び3回目)が終了せず、生後12か月を超えた場合 ⇒残りの初回接種は行わず、最終接種から27日以上の間隔において追加を接種
		生後7か月～ 12か月未満	初回 2回	生後12か月未満で、27日以上の間隔において2回 標準>>27日以上56日までの間隔
			追加 1回	初回2回目から7か月以上 標準>>初回2回目から7か月以上13か月までの間隔
			注意事項	初回接種(2回目)が終了せず、生後12か月を超えた場合 ⇒初回2回目の接種は行わず、初回1回目から27日以上の間隔において追加を接種
小児用肺炎球菌	生後2か月～ 5歳未満 ※接種開始年齢により 接種回数が異なります	生後2か月～ 7か月未満	初回 3回	生後24か月未満で、27日以上の間隔において3回 標準>>生後12か月までに接種
			追加 1回	生後12か月以降で、初回3回目から60日以上 標準>>生後12か月から15か月未満の間に接種
			注意事項	生後12か月以降に初回2回目を接種した場合 ⇒初回3回目の接種は行わず、初回2回目から60日以上の間隔において追加を接種
		生後7か月～ 12か月未満	初回 2回	生後24か月未満で、27日以上の間隔において2回 標準>>生後12か月までに接種
			追加 1回	生後12か月以降で、初回2回目から60日以上
			注意事項	初回接種(2回目)が終了せず、生後24か月を超えた場合 ⇒初回2回目の接種は行わず、初回1回目から60日以上の間隔において追加を接種
		1歳～2歳未満	2回	60日以上の間隔において2回
		2歳～5歳未満	1回	

★令和2年10月1日からロタが定期予防接種になります。
令和2年8月1日以降に生まれた人が対象です。

種類	対象年齢	接種開始年齢	接種回数	接種間隔
ロタ (経口) ※1	生後6週0日～ 24週0日	標準>> 生後2か月～ 14週6日	2回	27日以上の間隔において2回飲む
		標準>> 生後2か月～ 14週6日	3回	27日以上の間隔において3回飲む

※1 ワクチンの種類によって接種方法が異なります。原則、最初に使用したワクチンを2回目以降も使用します。

☆注意☆
記載内容は令和2年2月現在の情報にて作成していますので、変更が生じることもあります。
変更は広報や小郡市ホームページ等でお知らせします。

種類	対象年齢	標準的な 接種年齢	接種 回数	接種間隔
B型肝炎	1歳未満	生後2か月～ 9か月未満	3回	27日以上の間隔において2回接種した後、 3回目は1回目から139日以上あけて接種
ジフテリア・百日せき・ 破傷風・ポリオ (四種混合)※2	生後3か月～ 7歳6か月未満	(初回) 生後3か月～ 12か月未満	初回 3回 追加 1回	20日以上の間隔において3回 標準>>20日以上56日までの間隔 初回3回目から6か月以上 標準>>初回3回目から1年以上1年6か月までの間隔
BCG	1歳未満	生後5か月～ 8か月未満	1回	
麻しん風しん1期	1歳～2歳未満		1回	
麻しん風しん2期	小学校就学前の1年間 (平成26年4月2日生～平成27年4月1日生)		1回	<接種期間> 令和2年4月1日～令和3年3月31日
水痘	1歳～3歳未満	(1回目) 生後12か月～ 15か月未満	2回	1回目から3か月以上 標準>>1回目から6か月以上12か月までの間隔
日本脳炎1期※3	生後6か月～ 7歳6か月未満	3歳	初回 2回	6日以上の間隔において2回 標準>>6日以上28日までの間隔
		4歳	追加 1回	初回2回目から6か月以上 標準>>初回2回目からおおむね1年の間隔
日本脳炎2期※3	9歳～13歳未満	9歳	1回	
ジフテリア・破傷風 (DT)	11歳～13歳未満	11歳	1回	
子宮頸がん※4	小学6年生～ 高校1年生の女子 (平成16年4月2日生～ 平成21年4月1日生)	中学1年生	3回	サーバリックス(2価) 2回目 1回目から1か月以上 標準>>1回目から1か月後
			3回目	1回目から5か月以上かつ 2回目から2.5か月以上 標準>>1回目から6か月後
			2回目	1回目から1か月以上 標準>>1回目から2か月後
			3回目	2回目から3か月以上 標準>>1回目から6か月後

- ※2 三種混合または不活化ポリオワクチンを接種し、接種が完了していない場合は、市健康課へご相談ください。
- ※3 日本脳炎の特例：平成17年5月から平成22年3月までの間、接種を勧める案内を控えていたことから、下記の場合は特例で接種することができます。
- (1)平成12年4月2日生～平成19年4月1日生の人
日本脳炎1期と2期(合計4回接種)の不足分を20歳未満の間に接種することができます。
- (2)平成19年4月2日生～平成21年10月1日生の人
1期の接種が終了していない人は、2期の時期(9歳～13歳未満)に1期不足分を接種することができます。
- ※4 ワクチンの種類によって接種方法が異なります。
現在、子宮頸がんワクチンの接種を積極的にはお勧めしていません。
有効性とリスクを理解した上で接種をお願いします。

6歳までの予防接種おすすめスケジュール
☆接種が済んだら、□にチェックまたは接種日を記入しましょう。


定期	「法律で受けるよう努めなければならない」とされている予防接種。対象年齢内に受ければ無料。																		
名称	月年齢	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳
経口生ワクチン ロタ 令和2年10月1日から定期接種	ロタリックス (1価)			①<→② 27日以上		生後6週から24週に2回 ①は生後2か月～14週6日													
	ロタテック (5価)			①<→②<→③ 27日以上 27日以上		生後6週から32週に3回 ①は生後2か月～14週6日													
★2種類のワクチンがあります 令和2年8月1日以降に 生まれた人が対象です				①<→②<→③ 27日以上 27日以上		初回3回目から7か月～13か月								④					
不活化ワクチン インフルエンザ菌b型 (ヒブ)				①<→②<→③ 27日以上 27日以上		初回3回目から60日以上あけ、生後12か月～15か月未満								④					
不活化ワクチン 小児用肺炎球菌				①<→②<→③ 27日以上 27日以上		初回3回目から1年～1年6か月								④					
不活化ワクチン B型肝炎				①<→② 27日以上		3回目は1回目から139日以上								③					
不活化ワクチン ジフテリア・百日せき・ 破傷風・ポリオ (四種混合)					①<→②<→③ 20日以上 20日以上									④					11歳(小学6年生)で ジフテリア・破傷風(DT) 1回
生ワクチン BCG							①												小学校就学前の1年間 (年長児)
生ワクチン 麻疹風しん														①					②
生ワクチン 水痘														①<→② 1回目から6か月～12か月					④9歳(小学4年生)で1回
不活化ワクチン 日本脳炎																①<→② 6日以上	②<→③ 1年後		

任意 希望により行う予防接種。接種費用は全額自己負担(有料)。

名称		月年齢																		
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	
生 ワクチン	おたふくかぜ													①					②	
不活化 ワクチン	インフルエンザ							毎年（10月～12月） 生後6か月以上13歳未満：2～4週間の間隔をあけて2回（4週間が望ましい） 13歳以上：1回または1～4週間の間隔をあけて2回（4週間が望ましい）												

2.予防接種の接種間隔

<異なった種類のワクチンを接種する場合の間隔>



<病気にかかった後の間隔>
○麻しん・・・回復後4週間あけて接種
○風しん、水ぼうそう、おたふくかぜ・・・回復後2～4週間あけて接種
○ウイルス性発疹症(手足口病、突発性発疹症等)・・・回復後1～2週間あけて接種
○かぜ、気管支炎、肺炎・・・かかりつけ医にご相談ください

<接種間隔の考え方>
・6日以上あける場合

令和2年4月											接種日
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4

上記のようになります。
接種可能日は4月11日以降となります。

6日以上・・・1週間後の同じ曜日から
20日以上・・・3週間後の同じ曜日から
27日以上・・・4週間後の同じ曜日から
それぞれ接種できます