

平成29年度予防接種のお知らせ

問合せ先 健康課健康推進係 ☎72-6666

定期予防接種は、それぞれの予防接種ごとに対象年齢が定められており、規定回数は無料で受けることができます。

種類	対象年齢	接種開始年齢	回数		接種間隔
ヒブ（インフルエンザ菌b型）	生後2か月～5歳未満	生後2～7か月未満 （標準的接種開始年齢）	初回	3回	生後12か月未満で、27日以上、標準的には56日までの間隔（生後12か月を超えた場合は初回接種は行わず、初回の最終接種から27日以上の間隔をおいて追加を接種）
			追加	1回	初回3回目接種から7か月以上、標準的には13か月までの間隔
		生後7～12か月未満	初回	2回	生後12か月未満で、27日以上、標準的には56日までの間隔（生後12か月を超えた場合は初回2回目は行わず、初回1回目から27日以上の間隔をおいて追加を接種）
			追加	1回	初回2回目接種から7か月以上、標準的には13か月までの間隔
		1歳～5歳未満	1回		
小児用肺炎球菌	生後2か月～5歳未満	生後2～7か月未満 （標準的接種開始年齢）	初回	3回	生後24か月未満で、27日以上の間隔（生後12か月以降に初回2回目を接種した場合は、初回3回目は接種せず、初回2回目から60日以上の間隔をおいて追加を接種）
			追加	1回	生後12か月以降で、初回3回目から60日以上の間隔
		生後7～12か月未満	初回	2回	生後24か月未満で、27日以上の間隔（生後24か月を超えた場合は、初回2回目は接種せず、初回1回目から60日以上の間隔をおいて追加を接種）
			追加	1回	生後12か月以降で、初回2回目から60日以上の間隔
		1歳～2歳未満	2回		60日以上の間隔
		2歳～5歳未満	1回		

種 類	対象年齢	標準的な接種年齢	回 数		接種間隔		
B型肝炎	1歳未満	生後2～9か月未満	3回		27日以上の間隔をおいて2回接種した後 3回目は1回目から139日以上あけて接種		
四種混合 ※1 [ジフテリア・百日せき 破傷風・ポリオ]	生後3か月 ～7歳6か月未満	《初 回》 生後3～12か月未満	初回	3回	20日以上、標準的には56日までの間隔		
不活化ポリオ ※1			追加	1回	初回3回目接種から6か月以上、 標準的には1年～1年6か月の間隔		
ジフテリア・破傷風 (DT)	11歳～13歳未満	11歳	1回				
BCG	1歳未満	生後5～8か月未満	1回				
水痘(みずぼうそう)	1歳～3歳未満	《初回》生後12～15か月	2回		3か月以上、標準的には6か月～12か月の間隔		
麻しん風しん1期	1歳～2歳未満		1回				
麻しん風しん2期	小学校就学前の1年間(平成23年4月2日生～平成24年4月1日生)		1回		接種期間：平成29年4月1日～平成30年3月31日		
日本脳炎1期 ※2	生後6か月 ～7歳6か月未満	3歳	初回	2回	6日以上、標準的には28日までの間隔		
		4歳	追加	1回	初回2回目接種から6か月以上、 標準的にはおおむね1年までの間隔		
日本脳炎2期 ※2	9歳～13歳未満	9歳	1回				
種 類	対象年齢	標準的な接種年齢	回 数	ワクチン名	標準的な接種方法	接種間隔	
子宮頸がん ※3	小学6年～ 高校1年 相当の女子 (平成13年4月2日生 ～平成18年4月1日生)	中学1年生	3回	サーバリックス	2回目	1回目の1か月後	1回目から1か月以上
					3回目	1回目の6か月後	1回目から5か月以上 2回目から2.5か月以上
				ガーダシル	2回目	1回目の2か月後	1回目から1か月以上
					3回目	1回目の6か月後	2回目から3か月以上

※1 ①三種混合ワクチンの製造が中止となったため、三種混合が接種完了していない人は、四種混合ワクチンでの接種となります。三種混合とポリオの接種回数が異なる場合は、健康課へご相談ください。

②生ポリオを2回接種している人は、ポリオは完了しています。生ポリオを1回接種している人は、不活化ポリオを1回接種しているとみなし、残りの回数を接種してください。

※2 日本脳炎の特例

①平成17年5月から平成22年3月まで積極的勧奨が差し控えられていました。平成9年4月2日生～平成19年4月1日生の人は、日本脳炎1期と2期（合計4回接種）の不足分を20歳未満の間に接種することができます。なお、平成23年5月20日までに接種を開始した人は接種間隔が上記と異なる場合があります。

②2期は9歳以上で接種となっています。平成19年4月2日生～平成21年10月1日生の人で、平成22年3月31日までに1期の予防接種が終了していない人は、2期の時期に1期不足分を接種することができます。

※3 現在、子宮頸がん予防ワクチンの接種を積極的にはお勧めしていません。接種にあたっては、有効性とリスクを理解した上で受けてください

<予防接種の接種間隔>

○異なる種類のワクチンを接種する場合の間隔

生ワクチン	不活化ワクチン
麻しん風しん混合 (麻しん・風しん単独)、 BCG、水痘	ヒブ、小児用肺炎球菌、 四種混合、ポリオ、 B型肝炎 日本脳炎、子宮頸がん
27日以上あける	6日以上あける

次回予防接種

○病気にかかった後の間隔

麻しん
 ……回復後4週間あけて接種
 風しん、水ぼうそう、おたふくかぜ
 ……回復後2～4週間あけて接種
 ウイルス性発疹症(手足口病、突発性発疹症など)
 ……回復後1～2週間あけて接種
 かぜ、気管支炎、肺炎
 ……かかりつけ医にご相談ください

<市内予防接種実施医療機関>

BCG、B肝…B型肝炎、四…四種混合、ポ…不活化ポリオ、DT…ジフテリア・破傷風、
 麻風…麻しん風しん混合、日…日本脳炎、ヒ…ヒブ、肺…小児用肺炎球菌、子…子宮頸がん、水…水痘

医療機関名	電話番号	住所	接種種類	接種曜日
赤松医院	72-2519	干潟680	四・DT・ポ・麻風・日・水	月～土(土は午前)
いけだクリニック	72-2325	小郡615-1	BCG・B肝・四・DT・ポ・麻風・日・水	月～土(水・土は午前)
井手胃腸科内科医院	73-1112	上西鯨坂10-1	B肝・四・DT・ポ・麻風・日・ヒ・肺・子・水	月・火・水・金の午後
梯医院	72-2800	祇園1-4-3	BCG・B肝・四・DT・ポ・麻風・日・ヒ・肺・子・水	月～土(土は午前)
きのした小児科クリニック	72-6856	小坂井440-7	BCG・B肝・四・DT・ポ・麻風・日・ヒ・肺・子・水	月・火・水・金・土(予約制)
協和病院	72-2121	祇園2-1-10	DT	月～金
黒岩医院	72-3077	二夕1264-4	BCG・B肝・四・DT・ポ・麻風・日・ヒ・肺・子・水	月～土(土は午前)(予約制)
権藤内科循環器科	72-3000	小坂井429-1	DT	月～土(土は午前)
さとう産婦人科	75-5366	津古1210	子	月・水・金の午前
高橋クリニック	23-0777	美鈴が丘5-12-6	B肝・四・DT・麻風・日・ヒ・肺・子・水	月～土(木・土は午前)
田中クリニック	75-5377	美鈴が丘5-12-3	DT・麻風・日・水	月～土(木・土は午前)
富安医院	73-1271	松崎764	BCG・B肝・四・DT・ポ・麻風・日・ヒ・肺・子・水	月～土(土は午前)
中原内科クリニック	75-8021	三国が丘1-13	B肝・DT・麻風・日・水	月～土(水は午前)
ひやまクリニック呼吸器内科	23-8550	大崎1020-2	DT・日(1期特例・2期)・子	月～土(火・金は午前)
古川医院	72-2415	小郡330-18	BCG・B肝・四・DT・麻風・日・ヒ・肺・水	月～土(土は午前)
仏坂内科医院	75-7802	三沢4225-28	四・DT・麻風・日・水	月～金(木は午前)
松尾医院	72-2011	小坂井279	B肝・四・DT・ポ・麻風・日・ヒ・肺・子・水	月～土(水・土は午前)
松隈産婦人科クリニック	73-3511	小郡1504-8	子	月・火・水・金・土(水・土は午前)
まどかファミリークリニック	23-0066	あすみ1-40	BCG・B肝・四・DT・ポ・麻風・日・ヒ・肺・子・水	月～土(水・土は午前)
山下こどもクリニック	41-7400	横隈735-5	BCG・B肝・四・DT・ポ・麻風・日・ヒ・肺・子・水	月～金の午後(予約制)
弥生ファミリークリニック	72-2414	上西鯨坂524	DT	火～金の午後(予約制)
渡辺内科胃腸科医院	75-3733	津古815-1	DT・麻風(2期)・日・水	月・火・水・金・土の午後(予約制)

- ①医療機関によって接種できる種類・曜日・時間が違うので、**事前に電話で確認し、予約**してください
- ②接種歴確認のため、母子手帳を持参してください
- ③福岡県予防接種広域化制度に加入している県内の医療機関であれば、市外でも受けることができます
- ④里帰り先で定期予防接種を希望する人は、**事前に申請**すると助成が受けられます。健康課へご相談ください
- ⑤長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったなどの特別な事情により、定期予防接種を受けられなかったと市に認められる人は、対象年齢外でも接種できますので、**事前に**健康課へご相談ください