平成28年度予防接種のお知らせ

●問合せ先　健康課健康推進係☎72-6666

定期予防接種は、それぞれの予防接種ごとに対象年齢が定められており、対象年齢内で規定の回数・接種間隔については無料で受けることができます。

種類	対象年齢	接種開始年齢	回　数	接種間隔
ヒブ（インフルエンザ菌b型）	生後２か月～５歳未満	生後２～７か月未満（標準的接種開始年齢）	初回３回	生後12か月未満で、27日以上、標準的には56日までの間隔（生後12か月を超えた場合は初回接種は行わず、初回の最終接種から27日以上の間隔をおいて追加を接種）
			追加１回	初回３回目接種から７か月以上、標準的には13か月までの間隔
		生後７～12か月未満	初回２回	生後12か月未満で、27日以上、標準的には56日までの間隔（生後12か月を超えた場合は初回２回目は行わず、初回１回目から27日以上の間隔をおいて追加を接種）
			追加１回	初回２回目接種から７か月以上、標準的には13か月までの間隔
		１歳～５歳未満	１回	
小児用肺炎球菌	生後２か月～５歳未満	生後２～７か月未満（標準的接種開始年齢）	初回３回	生後24か月未満で、27日以上の間隔（生後12か月以降に初回２回目を接種した場合は、初回３回目は接種せず、初回２回目から60日以上の間隔をおいて追加を接種）
			追加１回	生後12か月以降で、初回３回目から60日以上の間隔
		生後７～12か月未満	初回２回	生後24か月未満で、27日以上の間隔（生後24か月を超えた場合は、初回２回目は接種せず、初回１回目から60日以上の間隔をおいて追加を接種）
			追加１回	生後12か月以降で、初回２回目から60日以上の間隔
		１歳～２歳未満	２回	60日以上の間隔
		２歳～５歳未満	１回	

種　類	対象年齢	標準的な接種年齢	回　数	接種間隔
四種混合 ※1［ジフテリア・百日せき破傷風・ポリオ］	生後３か月～７歳６か月未満	《初　回》生後３～12か月	初回３回	20日以上、標準的には56日までの間隔
不活化ポリオ ※1			追加１回	初回３回目接種から６か月以上、標準的には１年後～１年６か月の間隔
ジフテリア・破傷風（ＤＴ）	11歳～13歳未満	11歳	１回	
ＢＣＧ	１歳未満	生後５～８か月未満	１回	
水痘（みずぼうそう）	１歳～３歳未満	《初回》生後12～15か月	２回	３か月以上、標準的には６か月～12か月の間隔
麻しん風しん１期	１歳～２歳未満		１回	
麻しん風しん２期	小学校就学前の１年間（平成22年４月２日生～平成23年４月１日生）		１回	接種期間：平成28年４月1日～平成29年３月31日
日本脳炎1期 ※2	生後６か月～７歳６か月未満	３歳	初回２回	６日以上、標準的には28日までの間隔
		４歳	追加１回	１期初回２回目接種から６か月以上、標準的にはおおむね１年までの間隔
日本脳炎２期 ※2	９歳～13歳未満	９歳	１回	

種 類	対象年齢	標準的な接種年齢	回 数	ワクチン名	標準的な接種方法		接種間隔
子宮頸がん	小学６年～高校１年相当の女子（平成12年４月２日生～平成17年４月１日生）	中学１年生	３回	サーバリックス	２回目	初回の１か月後	初回１回目から１か月以上
					３回目	初回の６か月後	初回１回目から５か月以上
							初回２回目から2.5か月以上
				ガーダシル	２回目	初回の２か月後	初回１回目から１か月以上
					３回目	初回の６か月後	初回２回目から３か月以上

※１　①ただし、三種混合ワクチンの製造が中止となったため、三種混合とポリオを同じ回数ずつ接種している場合は、四種混合の接種が可能です。三種混合とポリオの接種回数が異なる場合は、健康課へご相談ください。これから接種開始する人は、四種混合での接種となります。
②生ポリオを２回接種している人は、ポリオは完了しています。生ポリオを１回接種している人は、不活化ポリオを１回接種しているとみなし、残りの回数を接種してください。

※２　日本脳炎の特例
①平成17年５月から平成22年３月まで積極的勧奨が差し控えられていました。平成８年４月２日生～平成19年４月１日生の人は、日本脳炎１期と２期（合計４回接種）の不足分を20歳未満の間に接種することができます。また、平成23年５月20日までに接種を開始した人は接種間隔が上記と異なる場合があります。ご不明な点は、健康課へお問い合わせください。なお、平成23年５月20日以降に接種開始した人は上記接種間隔になります。
②２期は９歳以上で接種となっています。平成19年４月２日生～平成21年10月１日生の人で、平成22年３月31日までに１期の予防接種が終了していない人は、２期の時期に１期不足分を接種することができます。

＜予防接種の接種間隔＞

○異なった種類のワクチンを接種する場合の間隔

生ワクチン	不活化ワクチン
麻しん風しん混合（麻しん・風しん単独）、ＢＣＧ、水痘	ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合、ポリオ、日本脳炎、子宮頸がん
27日以上あける	６日以上あける

次回予防接種

○病気にかかった後の間隔

麻しん
　・・・・・・回復後４週間あけて接種
風しん、水ぼうそう、おたふくかぜ
　・・・・・・回復後２～４週間あけて接種
ウイルス性発疹症（手足口病、突発性発疹症など）
　・・・・・・回復後１～２週間あけて接種
かぜ、気管支炎、肺炎
　・・・・・・かかりつけ医にご相談ください

＜市内予防接種実施医療機関＞

ＢＣＧ、四・・・四種混合、ポ・・・不活化ポリオ、ＤＴ・・・ジフテリア・破傷風、麻風・・・麻しん風しん混合、日・・・日本脳炎、ヒ・・・ヒブ、肺・・・小児用肺炎球菌、子・・・子宮頸がん、水・・・水痘

医療機関名	電話番号	住　所	接種種類	接種曜日
赤松医院	72-2519	干潟680	四・DT・ポ・麻風・日・子・水	月～土（土は午前）
いけだクリニック	72-2325	小郡615-1	BCG・四・DT・ポ・麻風・日・水	月～土（水・土は午前）
井手胃腸科内科医院	73-1112	上西鯵坂10-1	四・DT・ポ・麻風・日・ヒ・肺・子・水	月・火・水・金の午後
梯医院	72-2800	祇園1-4-3	BCG・四・DT・ポ・麻風・日・ヒ・肺・子・水	月～土（土は午前）
きのした小児科クリニック	72-6856	小板井440-7	BCG・四・DT・ポ・麻風・日・ヒ・肺・子・水	月・火・水・金・土（予約制）
協和病院	72-2121	祇園2-1-10	DT	月～金
黒岩医院	72-3077	二夕1264-4	BCG・四・DT・ポ・麻風・日・ヒ・肺・子・水	月～土（土は午前）
権藤内科循環器科	72-3000	小板井429-1	DT・子	月～土（土は午前）
さとう産婦人科	75-5366	津古1210	子	月・水・木・金の午前
髙橋クリニック	23-0777	美鈴が丘5-12-6	四・DT・ポ・麻風・日・ヒ・肺・子・水	月～土（木・土は午前）
富安医院	73-1271	松崎764	BCG・四・DT・ポ・麻風・日（１期）・ヒ・肺・子・水	月～土（土は午前）
中原内科クリニック	75-8021	三国が丘1-13	DT・麻風・日・水	月～土（水は午前）
ひやまクリニック呼吸器内科	23-8550	大崎1020-2	DT・日（１期特例・２期）・子	月～土（火・金は午前）
古川医院	72-2415	小郡330-18	BCG・四・DT・麻風・日・ヒ・肺・水	月～土
仏坂内科医院	75-7802	三沢4225-28	四・DT・麻風・日・水	月～土（木・土は午前）
松尾医院	72-2011	小板井279	四・DT・ポ・麻風・日・ヒ・肺・子・水	月～土（水・土は午前）
松隈産婦人科クリニック	73-3511	小郡1504-8	子	月・火・水・金・土（水・土は午前）
まどかファミリークリニック	23-0066	三国が丘1-50-2	BCG・四・DT・ポ・麻風・日・ヒ・肺・子・水	月～土（水・土は午前）
毛利クリニック	75-0200	希みが丘1-12-12	BCG・四・DT・ポ・麻風・日・ヒ・肺・子・水	月～土（木は午前、予約制）
山下こどもクリニック	41-7400	横隈735-5	BCG・四・DT・ポ・麻風・日・ヒ・肺・水	月～土の午後（予約制）
弥生ファミリークリニック	72-2414	上西鯵坂524	DT	火～金の午後（予約制）
渡辺内科胃腸科医院	75-3733	津古815-1	DT・麻風（２期）・日・水	月・火・水・金・土の午後

①医療機関によって接種できる種類・曜日・時間が違うので、**事前に電話で確認し、予約**をしてください。
②接種歴確認のため、母子手帳を持参してください。
③福岡県予防接種広域化制度に加入している県内の医療機関であれば市外でも受けることができます。
④里帰り先で定期予防接種を希望する人は、**事前に申請**すると助成が受けられます。健康課へご相談ください。
⑤長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったなどの特別な事情により、定期予防接種を受けられなかったと市に認められる人は、対象年齢外でも接種できますので、**事前に**健康課へご相談ください。